

Профилактика педикулёза

Педикулез – это паразитарное заболевание человека.

Различают три вида педикулеза – головной, платяной и лобковый.

Педикулез (вшивость) – это поражение мелкими паразитическими насекомыми, встречается у людей всех возрастов, вне зависимости от социального статуса.

Заражение педикулезом часто происходит в организованных коллективах, где дети находятся в близком контакте друг с другом, а также в местах скопления людей (поездах, автобусах, троллейбусах и т.д.). При передвижении в общественном транспорте не допускать прикосновения головы к подголовнику, а так же нужно держать дистанцию с людьми, чей внешний вид вызывает подозрение.

Головной педикулез:

Головная вошь – это исключительно человеческий паразит, которая не передается от животных и животным. Это бескрылое насекомое длиной 2-4 мм с серо-белым телом, имеет на теле 6 лапок, питается кровью человека. Живет и размножается на волосяной части головы, чаще встречается на висках, затылке, в области за ушами.

Основными симптомами заражения педикулезом является сильный зуд в области головы, покраснения в местах расчесов, которые появляются из-за укусов вши, чувство шевеления волос, появляются микро-ранки, высыпания в виде небольших гнойничков в местах расчесов.

При внимательном осмотре волосяной части головы можно увидеть вшей и гниды (яйца вши), которые прикреплены у основания волоса специальным клейким веществом. Иногда при осмотре волосяной части головы, гниды можно ошибочно принять за перхоть. Из гниды через 8-10 дней выходит молодая особь – нимфа, которая через 2 недели сможет размножаться. Продолжительность жизни взрослой особи 25-30 дней. Одна особь головной вши за всю свою жизнь дает потомство 150-200 особей.

Гниды крепко прикреплены у основания волоса, тяжело удаляются, при надавливании издают характерный треск. На окружающих предметах гнида сохраняет жизнеспособность 10-12 месяцев.

При обнаружении головного педикулеза нужно внимательно осмотреть всех контактных лиц, это необходимо для выявления и не распространения вшей на здоровых людей. Обработать волосяную часть головы средством от педикулеза, согласно инструкции. Вымыть голову и механическим способом, специальным густым гребнем вычесать или выбирать руками погибших насекомых. Для лучшего снятия гнид, пряди волос смачивают в растворе приготовленном из равного количества воды и 9% столового уксуса.

Нужно не только обрабатывать волосяную часть головы, но и провести санитарную обработку одежды, головных уборов, постельных принадлежностей, расчесок.

Снизить риск заражения педикулезом позволит гигиенический контроль, обследование и лечение контактных лиц, использование личных предметов гигиены (расчески, полотенца), одежды постельного белья.